



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

FACTORES ASOCIADOS A LA ADHERENCIA AL
TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL DE GRAN
ACTIVIDAD EN PACIENTES CON VIH /SIDA EN EL
HOGAR SAN CAMILO.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE PROFESIONAL DE
ENFERMERÍA

AUTORA
BRAVO MONTENEGRO YLIANA AYDEÉ

ASESORA
LIC .GLORIA CISNEROS ESCOBAR

LINEA DE INVESTIGACIÓN
CUIDADOS DE LA SALUD- ENFERMEDAD EN LOS NIVELES
FAMILIAR Y COMUNITARIO

LIMA – PERÚ
2013

DEDICATORIA

*A Dios, por darme la oportunidad de vivir
Y por estar conmigo en cada paso que doy,
Por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente
Y por haber puesto en mi camino a aquellas personas
Que han sido mi soporte y compañía durante
Todo el periodo de estudio*

AGRADECIMIENTO

A mi familia por el apoyo incondicional En el
Cumplimiento de mis metas, madre CLARA
MONTENEGRO MONTENEGROA padre
JOSE BRAVO SAAVEDRA por su apoyo
Incondicional para lograr todas mis metas

A todos mis hermanos que estuvieron
Pendientes de mí Durante el periodo
de estudio y fueron mi fuerza para salir
adelante y a mi asesora por la enseñarme
la perseverancia ante las dificultades de la vida

PRESENTACION

La alta incidencia de casos de VIH/SIDA demanda de la participación de todos los profesionales de la salud, quienes tienen la responsabilidad social, científica y humana de ejecutar acciones efectivas en la lucha contra este mal, en especial enfermería, que es ciencia y arte del cuidado

Cabe recalcar la importancia del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) para la prolongación de la vida, mejorando la calidad de la misma y prevención de infecciones oportunistas en pacientes portadores de este mal por lo cual el objetivo del presente estudio es Determinar los factores asociados a la adherencia al TARGA en paciente con VIH/SIDA del HOGAR SAN CAMILO.

El presente trabajo de investigación titulado factores asociados a la adherencia al (TARGA)) en pacientes con VIH /SIDA permite al profesional de enfermería detectar precozmente al posible incumplidor, teniendo en cuenta los factores identificados para que elaboren estrategias de intervención que mejoren la Adherencia al TARGA

ÍNDICE

	Pág.
Caratula	.
Dedicatoria	II
Agradecimiento	III
Presentación	IV
RESUMEN	V
ABSTRACT	VI
1. INTRODUCCIÓN	IX
1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	10
1.1.1. Realidad problemática	10
1.1.2. Formulación del Problema	13
1.1.3. Justificación	13
1.1.4. Antecedentes	14
1.1.5. Objetivos	21
1.1.5.1 General	21
1.1.5.2 Específico	21
1.2. MARCO REFERENCIAL	22
1.2.1. Marco teórico	22
1.2.2. Marco conceptual	34
2. MARCO METODOLÓGICO	36
2.1. Hipótesis	36
2.2. Variables	36
2.2.1. Definición conceptual	36

2.2.2. Definición operacional	37
2.3. Metodología	37
2.3.1. Tipo de estudio	37
2.3.2. Diseño	37
2.4. Población, muestra y muestreo	38
2.5. Método de investigación	39
2.6. Técnica e instrumentos de recolección de datos	39
2.7. Métodos de análisis de datos	40
3. RESULTADOS	42
4. DISCUSION	52
5. CONCLUSIONES	55
6. SUGERENCIAS	56
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	57
8. ANEXOS	

RESUMEN

El presente trabajo de investigación busca como Objetivo: determinar los factores asociados a la adherencia al TARGA, para lo cual se ha seguido la siguiente Metodología: la investigación corresponde a un tipo de estudio descriptivo de corte transversal, realizó en la Institución del Hogar San Camilo del Cercado de Lima. La población total de la institución fue de 332 pacientes de ambos sexos. La muestra estuvo conformada por 98 pacientes seleccionados aleatoriamente, a quienes se les aplicó un instrumento de medición para conocer los factores asociados a la adherencia. Los resultados muestran que los factores estudiados si están asociados a la adherencia al TARGA relativamente conclusión: Existe asociación de factores estudiados que van a determinar el porcentaje de adherencia al tratamiento antirretroviral.

Palabras Claves: Factores asociados, adherencia, TARGA, VIH/SIDA.

ABSTRACT

The present investigation sought as Objective: To determine the factors associated with adherence to HAART wing, for which we have followed the following methodology: research corresponds to a type of cross-sectional descriptive study, conducted at the Hogar San Camilo Institution of Cercado de Lima. The total population of the institution was 332 patients of both sexes between 18 and 60 years old. The sample consisted of 98 randomly selected patients who were applied to a measuring instrument to determine the factors associated with adherence. The results shown by the Chi 2 that the four factors studied if they are associated with a relatively conclusion adherence to HAART: A relationship exists studied factors that will determine the percentage of adherence to antiretroviral therapy.

Keywords: associated factors, adherence, HAART, HIV / AIDS.