



ESCUELA DE POSGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Causas que restringen el acceso al consultorio diferenciado
del adolescente en salud sexual reproductiva - Hospital San
Francisco, 2018

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:
Maestra en Gestión de Servicios de la Salud

AUTORAS:

Br. Sulca Contreras, Anita
Br. Astuvilca Quijada, Eva Gladys

ASESORA:

Mg. Orellana Quispe, Lucy

SECCIÓN:

Ciencias Médicas

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Calidad de las prestaciones asistenciales y gestión del riesgo en salud

PERÚ- 2018

RESUMEN

La presente investigación tiene como objeto de estudio “Conocer las causas que restringen el acceso al consultorio diferenciado del adolescente en salud sexual reproductiva, Hospital San Francisco, 2018”. Tipo de estudio diseño descriptivo simple, población de 100 adolescentes. Muestra de 90 adolescentes. Instrumento ficha de encuesta. Procesados mediante el software IBM SPSS versión 25.0, se desarrolló la prueba piloto en 10 integrantes, aplicando el coeficiente de Alfa de Cronbach, procesado en el SPSS versión 24.0, con evidencia (0,882). Además se realizó la validación estadística con R de Pearson, cuyos resultados superan el nivel mínimo que es 0.21, hecho que ha permitido aplicar el instrumento para el acopio de datos. **Conclusión.** Las causas que restringen el acceso al consultorio diferenciado del adolescente son: Dimensión demográfica del 100% de adolescentes el 42,2% es el grado de estudios; el 30% la religión, el 16,7% la persona con quién vive; mientras que, el 11,1% la edad. Dimensión social del 100% de adolescentes el 57,8% aduce limitación de los padres; el 25,6% limitación de la sociedad(los vecinos, amigos y otros.); el 14,4%, conocimiento del consultorio en donde orientan y aconsejan; mientras que, el 2,2% limitación de los profesores. Dimensión institucional, del 100% de adolescentes el 52,2% afirman las instalaciones inadecuadas; el 33,3% ubicación del ambiente; mientras que, el 14,4% no es adecuada la información en banner, afiche y otros.

Palabras clave: Consultorio diferenciado.

ABSTRACT

The present investigation has as object of study "To know the causes that restrict the access to the differentiated office of the adolescent in reproductive sexual health, Hospital San Francisco, 2018". Type of study simple descriptive design, population of 100 adolescents. Sample of 90 teenagers. Instrument survey file. Processed using the software IBM SPSS version 25.0, the pilot test was developed in 10 members, applying the Cronbach's Alpha coefficient, processed in the SPSS version 24.0, with evidence (0,882). In addition statistical validation was performed with Pearson's R, whose results exceed the minimum level, which is 0.21, a fact that has allowed the instrument to be applied for the collection of data. Conclusion. The causes that restrict the access to the differentiated office of the adolescent are: Demographic dimension of 100% of adolescents 42.2% is the degree of studies; 30% religion, 16.7% the person with whom they live; while, 11.1% age. Social dimension of 100% of adolescents 57.8% adduce limitation of parents; 25.6% limitation of society (neighbors, friends and others.); 14.4%, knowledge of the office where they guide and advise; while, 2.2% limitation of teachers. Institutional dimension, of 100% of adolescents 52.2% affirm inadequate facilities; 33.3% location of the environment; while, 14.4% is not adequate information in banner, poster and others.

Keywords: Differentiated Clinic.