



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE HUMANIDADES

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

“Niveles de ansiedad en gestantes adolescentes y adultas que han sufrido violencia familiar atendidas en un centro de Salud de Piura-2016”

AUTOR:

Bach. Castillo Córdova, Emérita

ASESOR:

Mg. Sandoval Carbajal, Javier

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Violencia

Piura - Perú

2016

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la diferencia de los niveles de ansiedad entre las gestantes adolescentes y adultas que han sufrido violencia familiar atendida en un centro de salud de Piura. La muestra estuvo conformada por 90 gestantes de las cuales 42 fueron adolescentes y 48 adultas.

El estudio siguió un diseño no experimental-transversal, de tipo descriptivo- comparativo. Para la recolección de los datos se utilizó la ficha de tamizaje de violencia familiar (VIF), para descartar si existe violencia familiar, psicológica, física, sexual, económica y por negligencia, finalmente se aplicó la Escala de Ansiedad de Hamilton para ver en qué nivel de ansiedad se encontraron las gestantes. Para el contraste de hipótesis se aplicó la prueba U de Mann Whitney para muestras independientes. Los resultados demostraron que no existen diferencias estadísticamente significativas de los niveles de ansiedad entre las gestantes adolescentes y adultas, que han sufrido violencia familiar atendidas en un centro de Salud de Piura.

Palabras claves: Ansiedad, ansiedad psíquica, ansiedad somática, violencia familiar.

ABSTRACT

The present research aimed to determine the difference in anxiety levels between pregnant adolescents and adults who have suffered family violence at a health center in Piura. The sample consisted of 90 pregnant women, of whom 42 were adolescents and 48 were adults. The study followed a non-experimental- transverse, ~~descriptive~~-comparative ~~design~~. The Family Violence Screening Card (FIV) was used to collect data, in order to rule out family, psychological, physical, sexual, and economic and negligence violence. Finally, the Hamilton Anxiety Scale was applied to see how Level of anxiety were found. For the hypothesis test, the Mann Whitney U test was used for independent samples. The results showed that there are no statistically significant differences in anxiety levels between pregnant adolescents and adults who have suffered family violence at a health center in Piura.

Keywords: Anxiety, psychic anxiety, somatic anxiety, family violence