



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA

PERFIL CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO DEL TRASTORNO DEPRESIVO EN
ADOLESCENTES HOSPITAL II- 2 TARAPOTO 2006 - 2016

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO

AUTOR:

Mori Pacherres Jhon Bruno

ASESOR:

Dra. MARÍA ROCÍO DEL PILAR LLAQUE SÁNCHEZ

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

SALUD MENTAL

TRUJILLO – PERÚ

2019

RESUMEN

El objetivo fue evaluar el perfil clínico epidemiológico del trastorno depresivo en adolescentes de 11 a 17 años en el Hospital II-2 de Tarapoto. El estudio fue descriptivo simple; Se revisaron 442 historias clínicas de pacientes atendidos en el consultorio externo de psiquiatría, mediante una ficha de recolección de datos. Se encontró, que, la incidencia fue de 70.64/100 pacientes. Y la prevalencia de 90.78/100 hb; respecto a los factores de riesgo no modificables, según la edad, predominó el grupo de 15 a 17 años (63.6%), y en relación al sexo, las mujeres en (72.4%). El 32.4 % procedía de Tarapoto seguido de Morales, 11.8 %, y en el 27.6% procedían de otros lugares; 56.3% tuvieron antecedentes familiares. En relación a los factores modificables el factor que predominó son: discusiones familiares (79.2%), es debido al alcoholismo familiar (31.7%) y respecto a la clínica, el 51.8 % los pacientes tuvieron pensamiento suicida; Según la intensidad de la depresión en los jóvenes, 55.2% tenía un episodio depresivo leve mientras que el 10.4% padecían de un episodio depresivo grave. Concluyéndose que la incidencia y la prevalencia ha ido en aumento en dicha localidad año tras año, la mayoría son del sexo femenino, y con factores modificables y no modificables importantes como la edad de 14 a 17, repetir curso, preocupación por un familiar, discusiones familiares, seguido del pensamiento suicida. Por otro lado, existe más episodios depresivos de intensidad leve que de mayores grados, dentro de la localidad de Tarapoto.

Palabras claves: *Perfil clínico epidemiológico, Trastorno depresivo, adolescentes*

ABSTRACT

The objective was to evaluate the epidemiological clinical profile of depressive disorder in adolescents aged 11 to 17 years at Hospital II-2 in Tarapoto. The study was simple descriptive. We worked with 442 clinical histories by means of a data collection card that met the inclusion criteria, belonging to the outpatient psychiatry office. All data were analyzed with descriptive statistics with comparative charts and graphs. It was found with respect to the age and sex of the psychiatric patients it can be appreciated that the most frequent age of the young people ranged from 15 to 17 years old at 63.6%, being most frequent in women, 72.4%. In the non-modifiable risk factors 32.4% came from Tarapoto followed by Morales, 11.8% while 27.6% came from elsewhere. 56.3% had a family history. In the modifiable factors the predominant factor is due to family arguments, 79.2% while a lesser degree, 31.7% is due to family alcoholism. 51.8% of the patients had suicidal thoughts. Finally, regarding the intensity of depression in young people, 55.2% had a mild depressive episode while 10.4% had a severe depressive episode. It is concluded that incidence and prevalence have been increasing in that locality year after year, the majority are female, and with important modifiable and non-modifiable factors such as age 14 to 17, grade repetition, concern for a family member, family arguments, followed by suicidal thoughts. On the other hand, there are more depressive episodes of mild intensity than of greater degrees within the locality of Tarapoto.

Keywords: *Clinical epidemiological profile, Depressive disorder, adolescents*