



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

“Conocimiento y Factores de Riesgo sobre Cáncer Cérvicouterino. Mujeres de 25 a 60 años. Comedor Popular Inmaculada Concepción Urpi – 2020”

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Enfermero

AUTORA:

Maria del Rosario Collazos Sanchez (ORCID: 0000-0002-7479-6406)

ASESORA:

Dra. Magali Milagros Chun Hoyos (ORCID: 0000-0003-4975-1940)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Enfermedades No Transmisibles

LIMA – PERÚ

2020

Dedicatoria

El presente trabajo está dedicado al esfuerzo y dedicación de mis padres, que a diario me ayudan y brindan sus buenos deseos para lograr ser una profesional. A mis abuelos Haydee e Isabel y en especial a mi tía Betty que con su ejemplo y consejos me inspiraron a continuar con esta bella carrera. Y a toda mi familia, gracias por sembrar en mí la esperanza de soñar con un futuro mejor.

Agradecimiento

Agradezco profundamente por los conocimientos brindados a la Mg. Liliana Rodríguez Saavedra y a mi asesora Dra. Magali Milagros Chun Hoyos, por la paciencia y los buenos consejos, a ellas y a todos los responsables que forjaron en mí la pasión por la enfermería.

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, Maria del Rosario Collazos Sanchez con DNI 77104228, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Enfermería, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y auténtica.

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, 16 de junio del 2020



Maria del Rosario Collazos Sanchez

DNI: 77104228

INDICE

Acta de aprobación de la tesis	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Índice	vi
RESUMEN	viii
ABSTRACT	ix
I. INTRODUCCIÓN	1
1.1 Realidad Problemática	3
1.2 Trabajos Previos.....	3
1.3 Teoría relacionada al tema	6
1.4 Marco Teórico	6
1.5 Formulación de la Pregunta	18
1.6 Justificación	18
1.7 Objetivos	18
II. METODOLOGÍA	19
2.1 Tipo y diseño de investigación	19
2.2 Operacionalización de variables	19
2.3 Población, muestra y muestreo.....	20
2.4 Técnicas de instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.....	21
2.5 Procedimiento.....	21
2.6 Métodos de análisis de datos.....	22
2.7 Aspectos éticos.....	22
III. RESULTADOS.....	23
IV. DISCUSION.....	31
V. CONCLUSIONES.....	34
VI. RECOMENDACIONES.....	35
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	36
ANEXOS	
Anexo 1: Matriz de Operacionalización	
Anexo 2: Confiabilidad	
Anexo 3: Recolección de datos	

Anexo 4: Libro de códigos

Anexo 5: Validación

Anexo 6: Resumen de Validación

Anexo 7: Consentimiento Informado

Anexo 8: Autorización para ejecutar la investigación

Anexo 9: Acta de aprobación de originalidad de tesis

Anexo 10: Autorización de Publicación de Tesis

RESUMEN

El cáncer cérvicouterino se ha convertido en la 2da causa de muertes a nivel mundial, siendo el principal medio de contagio el haber iniciado su actividad sexual, acompañado de los diversos factores de riesgo que conllevarían a contraer esta enfermedad, por este motivo el presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento y factores de riesgo sobre cáncer cérvicouterino. Mujeres de 25 a 60 años. Comedor Popular “Inmaculada Concepción Urpi”, 2020. El estudio tuvo como diseño no experimental, de enfoque cuantitativo, de corte transversal, tipo de investigación es básica y el nivel de investigación es descriptivo. Los resultados obtenidos de la variable conocimiento, demuestran que el 1.43% de las mujeres tienen un conocimiento bajo, el 71.43% de las mujeres tienen un conocimiento medio y el 27.14% de las mujeres tienen un conocimiento bajo. En tanto la dimensión generalidades un 22.86% de las mujeres tienen un conocimiento bajo, el 70% de las mujeres tienen un conocimiento medio y el 7.14% tienen un conocimiento alto. En la dimensión sintomatología un 32.86% de las mujeres tienen un conocimiento bajo, el 45.71% de las mujeres tienen un conocimiento medio y el 21.43% de las mujeres tienen un conocimiento bajo. En la dimensión medidas preventivas un 24.29% de las mujeres tienen un conocimiento bajo, el 25.71% de las mujeres tienen un conocimiento medio y el 50% de las mujeres tienen un conocimiento alto. En los resultados de la variable factores de riesgo, demuestran que el 10% de las mujeres tienen un factor de riesgo ausente y el 90% de las mujeres tienen un factor de riesgo presente. En tanto la dimensión factores sexuales un 4.29% de las mujeres tienen un factor de riesgo ausente y el 95.71% de las mujeres tienen un factor de riesgo presente. En la dimensión paridad un 20% de las mujeres tienen un factor de riesgo ausente y el 80% de las mujeres tienen un factor de riesgo presente. En la dimensión hábitos nocivos un 44.29% de las mujeres tienen un factor de riesgo ausente y el 55.71% de las mujeres tienen un factor de riesgo presente. Conclusiones: Las mujeres de 25 a 60 años del comedor popular inmaculada concepción URPI, tienen un nivel de conocimiento medio sobre cáncer cérvicouterino. Las mujeres de 25 a 60 años del comedor popular inmaculada concepción URPI, tienen un factor de riesgo presente sobre cáncer cérvicouterino.

Palabras claves: Cáncer cérvicouterino, factores de riesgo

ABSTRACT

Cervical cancer has become the 2nd cause of death worldwide, the main means of contagion being having started sexual activity, accompanied by various risk factors that would lead to contracting this disease, for this reason the present study had as objective to determine the level of knowledge and risk factors about cervical cancer. Women from 25 to 60 years old. Comedor Popular "Inmaculada Concepción Urpi", 2020. The study had a non-experimental design, a quantitative approach, cross-sectional, type of research is basic and the level of research is descriptive. The results obtained from the knowledge variable show that 1.43% of women have low knowledge, 71.43% of women have medium knowledge and 27.14% of women have low knowledge. While the generalities dimension 22.86% of women have low knowledge, 70% of women have medium knowledge and 7.14% have high knowledge. In the symptomatology dimension, 32.86% of women have low knowledge, 45.71% of women have medium knowledge, and 21.43% of women have low knowledge. In the preventive measures dimension, 24.29% of women have low knowledge, 25.71% of women have medium knowledge, and 50% of women have high knowledge. In the results of the variable risk factors, they show that 10% of women have an absent risk factor and 90% of women have a risk factor present. While the sexual factors dimension, 4.29% of women have an absent risk factor and 95.71% of women have a risk factor present. In the parity dimension, 20% of women have an absent risk factor and 80% of women have a risk factor present. In the harmful habits dimension, 44.29% of women have an absent risk factor and 55.71% of women have a present risk factor. Conclusions: The women from 25 to 60 years of age from the immaculate popular conception of the urpi dining room have a medium level of knowledge about cervical cancer. Women between the ages of 25 and 60 in the immaculate conception of urpi popular dining room have a risk factor for cervical cancer.

Keywords: Cervical cancer, risk factors